

HOJA DE DATOS TÉCNICOS FACYT IMPID 60

INSECTICIDA – TERÁPICO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS
GRUPO 4

- 1) **Nombre:** FACYT IMPID 60
- 2) **Nº: SENASA:** 39.352
- 3) **Formulación:** Suspensión concentrada para el Tratamiento de Semillas.
- 4) **Composición:**

imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina..... 60 g
inertes, coadyuvantes y colorantes.... c.s.p.100 cm³

- 5) **Información General:** FACYT IMPID 60 es un insecticida sistémico que actúa por ingestión y contacto, y se usa como terapico de semillas para el control en forma temprana, desde el arranque, de numerosas plagas que afectan a diversos cultivos como cereales, algodón, papa, soja, girasol y praderas.
- 6) **Indicaciones para el uso:** La semilla que va a ser tratada con **FACYT IMPID 60** debe ser previamente ventilada para eliminar los restos vegetales, polvos, etc. y debe tener buena energía y poder germinativo. Poner especial atención en las dosificaciones cuando se inician los tratamientos. Utilizar equipos que aseguren un buen recubrimiento del producto sobre la semilla.
- 7) **Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:** TRATAMIENTO GENERAL: Aplicar las dosis recomendadas de **FACYT IMPID 60** concentrada o diluida en la cantidad de agua necesaria para garantizar un buen recubrimiento de la semilla (según el equipo para tratamiento de semillas con que se cuente).
- 8) **Recomendaciones de uso:**

Cultivo	Plaga	Dosis (cm ³ / 100 kg de semilla)	Momento de Aplicación
Alfalfa	Gusano alambre <i>(Discynerus gagates)</i> Gusano blanco <i>(Diloboderus abderus)</i> Gusanos alambre <i>(Agriotes spp.)</i> Gusanos alambre	500	Previo a la siembra.

	(<i>Conoderus spp.</i>) Gusanos blancos (<i>Cyclocephala signaticolis</i>) Gusanos blancos (<i>Colaspis spp.</i>) Gusanos blancos (<i>Maecolaspis sp.</i>) Pulgón azul (<i>Acyrtosiphon kondoi</i>) Pulgón de la alfalfa (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Pulgón de las leguminosas (<i>Aphis craccivora</i>) Pulgón manchado de la alfalfa (<i>Therioaphis trifolii</i>) Pulgón negro de las leguminosas (<i>Aphis cytisorum</i>)		
Algodón	Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>) Tenebriónido del girasol (<i>Blapstinus spp.</i>) Trips (<i>Frankliniella paucispinosa</i>)	470	
Avena	Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)	175	
Girasol (*)	Tenebriónido del girasol (<i>Blapstinus spp.</i>)	500 - 600	
Maíz	Mal del Río Cuarto (**) (<i>Delphacodes kuschelli</i>)	500 - 750	
	Chicharrita del Maíz (<i>Dalbulus maydis</i>)	800	
Papa	Pulgón de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)	25	
Poroto	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	70 - 100	
Soja	Picudo de la soja (<i>Promecops carinicolis</i>)	50 - 70	
Sorgo	Pulgón del maíz (<i>Rhopalosiphum maidis</i>)	750	
Trigo	Gorgojo del trigo (<i>Listronotus bonariensis</i>) Gusano alambre (<i>Discynerus gagates</i>) Gusano blanco (<i>Diloboderus abderus</i>) Gusanos alambre (<i>Agriotes spp.</i>) Gusanos alambre	60 - 100	

	(<i>Conoderus spp.</i>) Gusanos blancos (<i>Cyclocephala signaticolis</i>) Gusanos blancos (<i>Colaspis spp.</i>) Gusanos blancos (<i>Maecolaspis sp.</i>) Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)		
Lechuga	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosca blanca (<i>Trialeurodes sp.</i>) Pulgón de la lechuga (<i>Hyperomyzus lactucae</i>) Trips (<i>Frankliniella spp.</i>)	50	

9) Restricciones de uso: “En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”

La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley N° 18.073 que prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con terapicos para tratamientos de semillas con granos destinados al consumo humano o animal. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

10) Compatibilidad: Es compatible con otros agroquímicos. Antes de realizar una mezcla, consultar con el Ingeniero Agrónomo.

11) Fitotoxicidad: FACYT IMPID 60 no genera fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

12) Términos y Condiciones: La empresa garantiza la calidad y la aptitud del producto siempre que se respeten las indicaciones del marbete. No se hará responsable por el mal uso del producto por parte del usuario, solo se limitará a la reposición del artículo utilizado.