

## HOJA DE DATOS TÉCNICOS GLIFACYT

HERBICIDA  
GRUPO G

**1) Nombre:** GLIFACYT

**2) N°: SENASA:** 38.150

**3) Formulación:** Concentrado Soluble (SL).

**4) Composición**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| glifosato ácido: N-(fosfonometil) glicina ..... | 35.6 g              |
| inertes y coadyuvantes c.s.p.....               | 100 cm <sup>3</sup> |

**5) Banda Toxicológica:** Azul.

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). Clase inhalatoria III (Cuidado).  
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos. No se dispone de antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**6) Información General:** GLIFACYT es un herbicida total postemergente para el control de numerosas malezas anuales y perennes en la mayoría de los cultivos (ver cuadro de recomendaciones de uso). También puede ser utilizado en el control de malezas en barbechos, previo a la siembra de cualquier cultivo. Asimismo, puede utilizarse para mantener limpias áreas agrícolas no cultivadas, caminos, alambrados y vías férreas, siempre que se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas. GLIFACYT posee acción sistémica, se absorbe por el follaje por lo que es importante que las malezas se encuentren en activo crecimiento en el momento de la aplicación. Luego se transporta a la parte aérea y a las raíces. Inhibe la síntesis de aminoácidos esenciales que conduce a una disminución de proteínas, necesarias para el crecimiento y desarrollo de la planta, lo que termina causando la muerte.

**7) Preparación:** GLIFACYT se presenta formulado como un concentrado soluble, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado. Agregar el producto al tanque de aplicación lleno con agua y con los agitadores en funcionamiento, manteniéndolos en marcha durante la aplicación.

## 8) Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Aplicaciones terrestres: debe utilizarse la dosis recomendada diluida en agua limpia, a razón de 80 – 120 l/ha. Las pastillas recomendadas son las de abanico plano) N° 80-03, 80-02, 110-02, 110-03) trabajando a una presión entre 25 y 40 libras/pulgada<sup>2</sup>. Se debe lograr una cobertura de 20 – 30 gotas/cm<sup>2</sup>. Para preparar la solución de aspersion debe llenarse el depósito con agua hasta la mitad, agregarle la dosis recomendada de **GLIFACYT** y completar el llenado. Debido a la alta solubilidad del herbicida, es suficiente la agitación provista por el retorno de la pulverizadora. Aplicaciones aéreas: aplicar volúmenes totales entre 15 y 30 litros por hectárea (herbicida + agua); observando las precauciones habituales en cuanto a horario y altura de vuelo, tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas. Las aplicaciones aéreas o terrestres no deben efectuarse cuando exista riesgo de deriva sobre plantas o cultivos susceptibles.

No aplicar si las malezas han sufrido estrés térmico o hídrico ya que esto determinará una menor eficacia del herbicida.

Tampoco aplicar si las malezas están cubiertas con tierra o si se prevé una lluvia durante las seis horas posteriores a la aplicación. El producto no debe aplicarse si la velocidad del viento supera los 12 km/h.

## 9) Recomendaciones de uso:

| CULTIVO  | MALEZA                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOSIS        | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos | <b>Altamisa</b><br>( <i>Ambrosia tenuifolia</i> )                                                                                                                                                                                                                                   | 3,5 l/ha     | Cuando las malezas están en crecimiento activo y no sufren estrés. Se puede hacer una aplicación complementaria con un residual para evitar el nacimiento de malezas provenientes de semillas. |
|          | <b>Amor seco o Saetilla</b><br>( <i>Bidens pilosa</i> )<br><b>Cien nudos</b><br>( <i>Polygonum aviculare</i> )                                                                                                                                                                      | 2,5 – 4 l/ha |                                                                                                                                                                                                |
|          | <b>Camalote</b><br>( <i>Panicum elephantipes</i> )<br><b>Cebollín</b><br>( <i>Cyperus rotundus</i> )<br><b>Cipero, Junquillo</b><br>( <i>Cyperus esculentus</i> )<br><b>Yuyo sapo</b><br>( <i>Wedelia glauca</i> )                                                                  | 6 l/ha       | Con malezas sin sufrir estrés; se logran mejoras resultados cuando el cebollín está en un 10% de floración.                                                                                    |
|          | <b>Capín (*)</b><br>( <i>Echinochloa colona</i> )<br><b>Capín arroz</b><br>( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br><b>Cebadilla</b><br>( <i>Bromus unioloides</i> )<br><b>Cola de zorro</b><br>( <i>Setaria spp.</i> )<br><b>Pasto de cuaresma</b><br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) | 2 a 3 l/ha   | Cuando las malezas están en crecimiento activo y no sufren estrés. Se puede hacer una aplicación complementaria con un residual para evitar el nacimiento de malezas provenientes de semilla.  |
|          | <b>Chamico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5 – 4      |                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ( <i>Datura ferox</i> )<br><b>Quinoa blanca</b><br>( <i>Chenopodium album</i> )<br><b>Yuyo colorado(*)</b><br>( <i>Amaranthus quitensis</i> )                                                                                                                                                                                                   | l/ha         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | <b>Enredadera anual</b><br>( <i>Polygonum convolvulus</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | <b>Gramón, Gramilla, Pasto bermuda. Pata de perdiz</b><br>( <i>Cynodon dactylon</i> )                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 l/ha       | Cuando comienza el crecimiento activo del gramón.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | <b>Nabón</b><br>( <i>Raphanus sativus</i> )<br><b>Roseta</b><br>( <i>Cenchrus incertus</i> )                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 l/ha       | Cuando las malezas están en crecimiento activo y no sufren estrés. Se puede hacer una aplicación complementaria con un residual para evitar el nacimiento de malezas provenientes de semillas.                                                                                                                    |
|                           | <b>Sorgo de Alepo (*)</b><br>( <i>Sorghum halepense</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5 a 4 l/ha |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frutales de pepita<br>Vid | <b>Camalote</b><br>( <i>Panicum elephantipes</i> )<br><b>Cebollín</b><br>( <i>Cyperus rotundus</i> )<br><b>Cipero, Junquillo</b><br>( <i>Cyperus esculentus</i> )<br><b>Yuyo sapo</b><br>( <i>Wedelia glauca</i> )                                                                                                                              | 6 l/ha       | Cuando las malezas están en crecimiento activo y no sufren estrés. En el monte frutal puede usarse en distintos momentos del programa de control de malezas:                                                                                                                                                      |
|                           | <b>Capín (*)</b><br>( <i>Echinochloa colona</i> )<br><b>Capín arroz</b><br>( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br><b>Cebadilla</b><br>( <i>Bromus unioloides</i> )                                                                                                                                                                                | 2 a 3 l/ha   | 1) En la línea de plantación.<br>2) Manchoneo.<br>3) Interfilas.<br>4) Acequias y desagües.                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | <b>Chamico</b><br>( <i>Datura ferox</i> )<br><b>Cien nudos</b><br>( <i>Polygonum aviculare</i> )<br><b>Enredadera anual</b><br>( <i>Polygonum convolvulus</i> )<br><b>Quinoa blanca</b><br>( <i>Chenopodium album</i> )<br><b>Sorgo de Alepo (*)</b><br>( <i>Sorghum halepense</i> )<br><b>Yuyo colorado</b><br>( <i>Amaranthus quitensis</i> ) | 2,5 a 4 l/ha | Se puede hacer una aplicación complementaria con un residual para evitar el nacimiento de malezas provenientes de semillas. Los mejores resultados para control de cebollín y sunchillo se obtienen cuando están en prefloración. Con respecto a gramón cuando los estolones tienen entre 10 y 15 cm de longitud. |
|                           | <b>Chufa salvaje</b><br>( <i>Cyperus esculentus</i> var. <i>Leptostachyus</i> )<br><b>Gramón, Gramilla, Pasto bermuda. Pata de perdiz</b><br>( <i>Cynodon dactylon</i> )<br><b>Sunchillo</b><br>( <i>Wedelia glauca</i> )                                                                                                                       | 6 l/ha       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | <b>Cola de zorro</b><br>( <i>Setaria</i> sp.)<br><b>Pasto de cuaresma</b><br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> )                                                                                                                                                                                                                                   | 2 a 3 l/ha   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Girasol<br>Maíz<br>Soja   | <b>Camalote</b><br>( <i>Panicum elephantipes</i> )<br><b>Chufa salvaje</b><br>( <i>Cyperus esculentus</i> var. <i>Leptostachyus</i> )                                                                                                                                                                                                           | 6 l/ha       | <u>Presiembra</u> : cuando las malezas tengan 20 a 30 cm de altura, y no sufran estrés.                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Leptostachyus)</b><br><b>Capín (*)</b><br><i>(Echinochloa colona)</i><br><b>Capín arroz</b><br><i>(Echinochloa crus-galli)</i><br><b>Cebadilla</b><br><i>(Bromus unioloides)</i><br><b>Cola de zorro</b><br><i>(Setaria sp.)</i><br><b>Pasto de cuaresma</b><br><i>(Digitaria sanguinalis)</i> | 2 a 3<br>l/ha   | Control de malezas del rastrojo para implantación de girasol en siembra directa; cuando las malezas tengan 20 a 30 cm de altura y estén en activo crecimiento, sin sufrir estrés.                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Cebollín</b><br><i>(Cyperus rotundus)</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 l/ha          | <u>Presiembra:</u> los tratamientos son más efectivos cuando las plantas están en prefloración (10% floración).<br>Control de malezas del rastrojo para implantación de girasol en siembra directa: mismas condiciones que en el caso anterior.                                                                                                                                                  |
|  | <b>Chamico</b><br><i>(Datura ferox)</i><br><b>Cien nudos</b><br><i>(Polygonum aviculare)</i><br><b>Enredadera anual</b><br><i>(Polygonum convolvulus)</i><br><b>Quinoa blanca</b><br><i>(Chenopodium álbum)</i><br><b>Yuyo colorado (*)</b><br><i>(Amaranthus quitensis)</i>                      | 2,5 a 4<br>l/ha | <u>Presiembra:</u> cuando las malezas tengan 20 a 30 cm de altura, y no sufran estrés.<br>Control de malezas del rastrojo para implantación de girasol en siembra directa; cuando las malezas tengan 20 a 30 cm de altura y estén en activo crecimiento, sin sufrir estrés                                                                                                                       |
|  | <b>Gramón, Gramilla, Pasto bermuda. Pata de perdiz</b><br><i>(Cynodon dactylon)</i>                                                                                                                                                                                                               | 6 l/ha          | <u>Presiembra:</u> cuando los estolones tengan 10 a 15 cm de largo y las plantas no sufran estrés. Control de malezas del rastrojo para implantación de girasol en siembra directa: mismas condiciones que en el caso anterior.                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Sorgo de Alepo (*)</b><br><i>(Sorghum halepense)</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5 a 4<br>l/ha | <u>Presiembra:</u> cuando las malezas tengan 20 a 30 cm de altura, y no sufran estrés.<br>Control de malezas del rastrojo para implantación de girasol en siembra directa; cuando las malezas tengan 20 a 30 cm de altura y estén en activo crecimiento, sin sufrir estrés                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5 l/ha        | Aplicación de pre siembra para lotes con alta infestación de sorgo de alepo (*). Es conveniente arar durante el invierno, trabajar con rastra de doble acción al comienzo de la primavera para trozar los rizomas y uniformizar la brotación.<br>Aplicar cuando la maleza tenga 30 – 50 cm de altura. La preparación de la cama de siembra realizarla a los 4 a 5 días después de la aplicación. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Sunchillo</b><br>( <i>Wedelia glauca</i> )                                                                                                                                                                        | 6 l/ha       | Presiembra: cuando las malezas están en crecimiento activo y no sufren estrés. Se obtienen mejores resultados cuando las plantas están en prefloración. Control de malezas del rastrojo para implantación de girasol en siembra directa: mismas condiciones que en el caso anterior. |
| <b>Pasturas</b>        | <b>Camalote</b><br>( <i>Panicum elephantipes</i> )<br><b>Cebollín</b><br>( <i>Cyperus rotundus</i> )                                                                                                                 | 5 a 6 l/ha   | Presiembra.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | <b>Capín arroz</b><br>( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br><b>Cebadilla criolla. Cebadilla australiana, Cebadilla</b><br>( <i>Bromus catharticus/wildenowii</i> )<br><b>Cola de zorro</b><br>( <i>Setaria spp.</i> ) | 2 a 3 l/ha   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | <b>Chufa salvaje</b><br>( <i>Cyperus esculentus var. Leptostachyus</i> )                                                                                                                                             | 3 a 5 l/ha   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | <b>Enredadera anual</b><br>( <i>Polygonum convolvulus</i> )                                                                                                                                                          | 2,5 a 4 l/ha |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | <b>Gramón, Gramilla, Pasto bermuda. Pata de perdiz</b><br>( <i>Cynodon dactylon</i> )                                                                                                                                | 5 a 6 l/há   | Presiembra. La dosis a aplicar dependerá del control deseado.                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | <b>Pasto de cuaresma</b><br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> )                                                                                                                                                         | 2 a 3 l/há   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | <b>Pasto puna</b><br>( <i>Stipa brachychaeta</i> )                                                                                                                                                                   | (*)          | Cuando la maleza supera la altura de la pastura, aplicado con equipo de alfombra a una concentración del 20% del producto formulado. (*) La cantidad de producto a utilizar depende de la infestación del lote.                                                                      |
| <b>Siembra directa</b> | <b>Dicotiledoneas y monocotiledoneas</b>                                                                                                                                                                             | 2,5 l/ha     | En el rastrojo del cultivo anterior, antes o inmediatamente después de la siembra de soja, maíz, girasol, etc. Se recomienda esperar 2 a 3 días después de la cosecha para que las malezas recuperen la capacidad de absorber y transportar el herbicida.                            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soja<br>RG/RR(Resistente al Glifosato) | <b>Abrojo grande</b><br>( <i>Xanthium cavanillesii</i> )<br><b>Capin arroz</b><br>( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br><b>Chamico</b><br>( <i>Datura ferox</i> )<br><b>Chinchilla</b><br>( <i>Tagetes minuta</i> )<br><b>Malva cimarrona</b><br>( <i>Anoda cristata</i> )<br><b>Pasto colorado</b><br>( <i>Echinochloa colonum</i> )<br><b>Pasto de cuaresma</b><br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br><b>Pie de gallina</b><br>( <i>Eleusine indica</i> )<br><b>Quinoa blanca</b><br>( <i>Chenopodium album</i> )<br><b>Sorgo de Alepo (*)</b><br>( <i>Sorghum halepense</i> )<br><b>Verdolaga</b><br>( <i>Portulaca oleracea</i> )<br><b>Yuyo colorado (*)</b><br>( <i>Amaranthus quitensis</i> ) | 2 l/ha   | <p>Aplicación sobre sojas genéticamente modificadas entre las 30 y 45 días después de la emergencia del cultivo y cuando las malezas tienen 2 ó 4 hojas.</p> <p>En caso de ser necesaria una segunda aplicación para el control de malezas que nazcan con posterioridad al primer tratamiento repetir las mismas dosis.</p>                                                               |
| Trigo                                  | <b>Sorgo de Alepo (*)</b><br>( <i>Sorghum halepense</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,5 l/ha | <p>Aplicar antes de la cosecha del trigo, para controlar altas infestaciones de sorgo de alepo (*) en lotes destinados al doble cultivo trigo-soja, en siembra convencional o directa. EL contenido de humedad del grano de trigo deberá ser igual o menor del 30% y el Sorgo de Alepo (*) deberá estar creciendo activamente y con una altura igual o superior al cultivo del trigo.</p> |
| Yerba mate                             | <b>Pasto de cuaresma</b><br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br><b>Pasto guinea</b><br>( <i>Panicum maximum</i> )<br><b>Yahapé</b><br>( <i>Imperata brasiliensis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 l/ha   | <p>1) Antes de la implantación del yerbal. Cobertura total.</p> <p>2) Yerbal implantado. En la línea. En cobertura total.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

(\*) Biotipo no resistente a glifosato.

**BARBECHOS QUÍMICOS DE CULTIVOS AGRICOLAS, AREAS AGRÍCOLAS NO CULTIVADAS, CAMINOS, ALAMBRADOS Y VÍAS FERREAS, ALEJADOS DE VIVIENDAS, CENTROS POBLADOS Y LUGARES DE TRÁNSITO FRECUENTE DE PERSONAS:**

**GLIFACYT** controla en forma efectiva las siguientes malezas: Amor seco (*Bidens subalternans*); Chamico; (*Datura ferox*); Cien nudos (*Polygonum aviculare*); Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*); Quinoa blanca (*Chenopodium album*); Sorgo de Alepo (\*) (*Sorghum halepense*) a la dosis de uso de 2,5 a 4 l/ha. Camalote (*Panicum elephantipes*); Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon*) a la dosis de uso de 5 a 6 l/ha.

Capín arroz (*Echinochloa crus-galli*); Cebadilla criolla, Cebadilla australiana, Cebadilla (*Bromus catharticus/wildenowii*); Cola de zorro (*Setaria spp.*); Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) a la dosis de uso de 2 a 3 l/ha. Cebollín (*Cyperus rotundus*); Sunchillo (*Wedelia glauca*) a la dosis de uso de 5 a 6 l/ha. Chufa salvaje (*Cyperus esculentus var. leptostachyus*) a la dosis de uso de 3 a 5 l/ha. Yuyo colorado (\*) (*Amaranthus quitensis*) a la dosis de uso de 2,5 a 4 l/ha.

Si las malezas son cortadas antes de la aplicación, esperar el rebrote para aplicar. Se obtienen mejores resultados cuando las plantas están en prefloración. Cuando las malezas están en crecimiento activo y no sufren estrés.

Vías férreas: Dosis 6.3 litros/ha. Debido a altas infestaciones normalmente presentes, se recomienda el uso de altos volúmenes de agua (200-400 litros/ha).

Banquinas, costados de caminos: Dosis: según las malezas presentes.

Alambrados y cercos: Dosis dilución al 2.5 – 5 %, pulverizando uniformemente el follaje sin que llegue a escurrir o gotear. Usar las concentraciones mayores cuando la densidad de infestación sea alta, o cuando se apliquen caudales bajos.

Áreas industriales o no cultivables: aplicar en primavera-verano con malezas jóvenes 2.5-6 litros/ha según el tamaño de la maleza a controlar. Cuando se observen rebrotes, 2.5 – 4 litros/ha.

Tapiz verde: para erradicar el tapiz verde existente y sembrar posteriormente, aplicar en toda la superficie a renovar. Dosis: según los componentes del tapiz.

Canales de riego y acequias: aplicar cuando no haya agua. Dosis: 2.5 - 6 litros/ha según presencia y tamaño de malezas.

## **10) Restricciones de uso:**

Exento de período de carencia.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las normativas provinciales y municipales correspondientes.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** 48 horas.

## **11) Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los agroquímicos normalmente utilizados.

No obstante, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fototoxicidad para los cultivos.

**12)Fitotoxicidad:** El producto no resulta fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

**13)Términos y Condiciones:** La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.