

HOJA DE DATOS TÉCNICOS FACYT TC+M

FUNGICIDA TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
(GRUPO 11 / GRUPO M3 / GRUPO 4)

1) Nombre: FACYT TC+M

2) SENASA N°: 39.230

3) Formulación: Suspensión Concentrada para el tratamiento de semillas (FS).

4) Composición:

tiram: bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo.....	15 g
carbendazim: 2- metoxicarbamoil bencimidazol.....	15 g
metalaxil: metil éster de DL-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-alanina.....	4,38 g
humectantes, colorante, coadyuvantes y agua c.s.p.....	100 cm ³

5) Banda Toxicológica: Azul

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO). NO IRRITANTE OCULAR NI DERMAL. NO SENSIBILIZANTE. No se dispone de antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático

6) Información General: FACYT TC+M actúa en forma preventiva, curativa y erradicante.

Tiene acción sistémica y de contacto por lo que permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla provocan una disminución en el stand de plantas.

7) Preparación y técnicas de aplicación: AGITAR ANTES DE USAR. Verter el producto en el tambor rotativo, lleno con semilla hasta la mitad de su capacidad. Mezclar durante unos minutos y completar con el resto de semilla, volviendo a mezclar por unos minutos más.

Para su correcta aplicación se recomienda emplear tambores rotativos con aletas fijas interiores tipo mezcladoras de materiales. A la dosis indicadas de **FACYT TC+M** agregar agua en la cantidad necesaria para lograr una aplicación fluida sobre las semillas. El volumen total de dilución es de aproximadamente 0,5 litros por cada 100 kg de semillas de soja.

Si se usa junto con inoculantes se recomienda aplicar primero el fungicida, dejar orear y luego aplicar el inoculante. Sembrar toda la semilla curada en forma inmediata o durante el día.

8) Recomendaciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (cm ³ /100 kg de semilla)
SOJA	Damping off y Complejo de hongos del suelo (<i>Fusarium sp.</i> , <i>Rhizoctonia sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> , <i>Mucor sp.</i> , <i>Diplodia sp.</i>) Podredumbre de la raíz (<i>Phytophthora sp.</i>)	200

9) Restricciones de Uso: Períodos de carencia: No corresponde por tratarse de un terapico para tratamiento de semilla.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

IMPORTANTE: Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite. La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la ley 18073 que prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados a consumo humano y/o animal. Comprobada la presencia del terapico para el tratamiento de semilla (fungicidas o insecticidas) en granos para consumo, la ley dictamina el decomiso y establece severas penas para los infractores.

Recuerde que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa.

10) Compatibilidad: Cuando se desee realizar mezclas con otros productos para el tratamiento de semillas, hacer pruebas de compatibilidad previamente. De todas formas, preparar cada producto por separado y luego aplicarlo a las semillas.

Es compatible con aplicación de inoculantes, recomendando sembrar lo antes posible una vez hecha la aplicación.

11) Fitotoxicidad: No afecta el poder germinativo de la semilla.**12) Términos y Condiciones:** La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.