

HOJA DE DATOS TÉCNICOS SULFACYT

1) **Nombre:** SULFACYT

2) **SENASA N°:** 17.595

3) **Formulación:** POLVO SOLUBLE

4) **Composición (% p/p):**

Nitrógeno amoniacal (N).....	21,0 %
Azufre (S).....	24,0 %

5) **Información General:** Polvo soluble de fácil disolución en agua, formulado a base de sulfato de amonio, surfactantes no-iónicos y siliconas, que actúan potenciando la acción de herbicidas.

La característica principal de este coadyuvante es la rápida acción que ejerce en el control de malezas, lo que lo hace ideal para acompañar los tratamientos con herbicidas en la etapa de barbecho. Además, favorece la penetración y traslocación de los principios activos dentro de la planta haciendo más efectiva la aplicación.

Sus propiedades tensioactivas y componentes siliconados permiten lograr un excelente mojado y cobertura de la hoja.

6) **Preparación:** Llenar el tanque del equipo con agua hasta sus $\frac{3}{4}$ partes de agua. Poner en marcha los agitadores y agregar la cantidad necesaria de **SULFACYT** de acuerdo a la dosis recomendada. Luego continuar con el agregado del agroquímico a aplicar.

7) **Recomendaciones de Uso:**

1 a 3 cajas de 10 Kg cada 3000 litros de agua.

Utilizar dosis mayores en estadios fenológicos avanzados de las malezas

CULTIVO	DOSIS	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES
Algodón	1,5 a 2 kg/ha	Iniciar con dosis bajas cuando exista follaje suficiente. Aumentar la dosis al aparecer los primeros síntomas de carencia. Efectuar 2 aspersiones más entre cortes.
Cucurbitáceas (melón, pepino, etc.)	1 a 2 kg/ha	A los 25 - 40 días después de la emergencia. Seguir con 1 o 2 aplicaciones en prefloración. Hacer 2 aplicaciones más cada 15 días.

Tomate	1 a 2 kg/ha	A los 15 días del transplante, usar dosis bajas. Realizar dos aspersiones antes de la floración y 2 durante la fructificación.
Hortalizas en general	1 a 2 kg/ha	A los 15 días del transplante, en siembra directa cuando exista follaje suficiente. Realizar 5 aplicaciones cada 15 días.
Leguminosas (soja, poroto, etc.)	1 a 2 kg/ha	Asperjar a los 20-30 días después de la emergencia, cerca de la floración y al iniciar la formación de las vainas.
Frutales (pera, manzana, cítricos, vid, etc.)	0,25 a 0,5 kg/100 l de agua	En árboles pequeños aplicar cada mes. En árboles grandes y vid después del corte, en prefloración y cuando el fruto esté desarrollado.
Ornamentales	0,5 kg/100 l de agua	Aplicar en pleno desarrollo y en prefloración.
Viveros, semilleros y almácigos	0,2 a 0,4 kg/100 l de agua	Aplicar cada 15 a 20 días.
Gramíneas (maíz, sorgo y caña de azúcar)	0,5 kg/ha	Aplicar hasta el momento de emisión de la panoja (VT).

- 8) Restricciones de uso:** Exento de período de carencia. Debe observarse el establecido para el plaguicida acompañante.
- 9) Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente. No usar con productos cuyos rótulos contraindiquen la adición de un sulfato de amonio.
- 10) Fitotoxicidad:** Bajo determinadas condiciones ambientales se pueden registrar síntomas de fitotoxicidad cuando es aplicado sobre cultivos en pie. Por lo que se recomienda aplicar dosis menores sobre cultivos.
- 11) Términos y Condiciones:** La empresa garantiza la calidad y aptitud del producto declarada en el marbete. La responsabilidad está limitada por el correcto uso del producto. Siempre consulte con su Ing. Agr. de confianza.