

Ensayo de eficacia de DOMADOR FACYT y MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT en el cultivo de SOJA.

Campaña 2014/15 - Ing. Agr. Silvia Distefano (INTA Marcos Juárez.)

Objetivo: Evaluar la respuesta en rendimiento del cultivo de Soja luego de la aplicación de **MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT** y fungicida **DOMADOR FACYT** (Azoxistrobina 12% + Tebucnazole 20%) durante la campaña 2014/15.

Localidad: Marcos Juárez (Córdoba).

Fecha de Siembra: 27/11/14.

Cultivar: ADM 4612 RR.

Resultados:

Tratamiento	Incidencia Mancha marrón		Severidad Mancha marrón	
	R3	R6	R3	R6
Testigo	5,25	43,75	6,78	37,38
Desestresante Facyt 0.3 L/ha (R1)	5,25	43,75	6,48	23,00
Domador Facyt 0.5 L/ha (R3)	5,75	45,00	6,48	25,55

Cuadro 1: Valores promedio de incidencia y severidad de "mancha marrón" (*Septoria glycines*) detectados en los estadios fenológicos R4 y R6 en los diferentes tratamientos.

Tratamiento	Incidencia Tizón de la hoja ES		Severidad Tizón de la hoja ES	
	R4	R6	R4	R6
Testigo	0,25	91,25	0,50	45,25
Desestresante Facyt 0.3 L/ha (R1)	0,50	95,00	0,25	35,78
Domador Facyt 0.5 L/ha (R3)	0,25	92,50	0,25	31,63

Cuadro 2: Valores promedio de incidencia y severidad de "tizón de la hoja" (*Cercospora kikuchii*) detectados en el estrato superior (ES) en los estadios fenológicos R4 y R6 en los diferentes tratamientos.


Fungicidas	Int. roya R6
Testigo	2,83
Desestresante Facyt 0.3 L/ha (R1)	2,78
Domador Facyt 0.5 L/ha (R3)	1,63

Cuadro 3: Valores promedio de la intensidad de "roya de la soja" (*Phakopsora pachyrhizi*) detectados en el estadio fenológico R6 en los diferentes tratamientos.



FACYT I+D S.A.

Autopista Córdoba-Rosario Km. 647 - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
Casilla de correo 31 (5974) - Laguna Larga - Córdoba - Argentina
infoventas@facyt.com - www.facyt.com - +54 351 5893229



La aplicación de DOMADOR FACYT y MOTIVADOR DESESTRESANTE FACYT disminuyeron la severidad de “mancha marrón” (*Septoria glycines*), “tizón de la hoja” (*Cercospora kikuchii*) y “roya de la soja” (*Phakopsora pachyrizii*) favoreciendo el aumento de rendimiento en un 3 % más que el testigo sin aplicación.

Gráfico 1: Valores promedio de rendimiento en kg/ha de todos los tratamientos.